



Soort	Boomvalk	Slechtvalk
Afbeeldingen		
Kenmerken	Lijkt zeer veel op de <b>Slechtvalk</b> in kleur en tekening, maar is kleiner, sierlijker en slanker met langere, smallere vleugels. Bovenzijde donker leigrijs, wangen en keel wit, onderkant wit met opvallende zwartachtige vlekken, roestbruine "broek", duidelijke baardstreep. Snavel grijs met donkere punt, washuid geel, poten geel, iris donkerbruin. Beide geslachten gelijk gekleurd, vrouwtje iets groter. Jonge vogels met bruinigrijze bovendelen, lichtbruine onderkant, zonder "broek".	Grote, compact gebouwde valk met spitse vleugels en korte staart. Contrastrijk gekleurd verenkleed. Bovenzijde leigrijs, bovenkop en baardstreep zwartachtig, onderdelen witachtig, dicht gebandeerd, Midden-Europees ras roestrood bewaasd, staart met zwarte dwarsbanden. Snavel lichtblauw met donkere punt, washuid geel, poten geel, nagels zwart, iris zwart. Vrouwtje donkerder en groter dan mannetje.
Afmetingen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lengte</li> <li>• Spanwijdte</li> <li>• Gewicht</li> </ul>	30 - 36 cm 76 - 82 cm (M) circa 200 gram / (V) circa 230 gram	(M) circa 38 cm / (V) circa 45 cm (M) circa 90 cm / (V) circa 105 cm (M) 580 - 720 gram / (V) 860 - 1090 gram
Vlucht	Vliegbeeld lijkt op dat van een <b>miniatuurslechtvalk</b> ; in verhouding tot de lichaamsgrootte zijn de vleugels langer, veel smaller en spits. Tijdens de jacht lijken de vleugels sikkelvormig, korte staart. Zweeft met gespreide staart op de thermiek; "bidt" slechts zelden.	Vliegbeeld lijkt op een anker, vleugels lang en spits, staart relatief kort, wordt naar uiteinde iets smaller. Vliegt met snelle ondiepe vleugelslagen, onderbroken door korte glijpauzes. Zweeft af en toe op opwaartse wind.
Geluid	GieGiegiegie GieGieGieGie enz	Tijdens de baltsvlucht een klagend, trillend lang aanhouden 'geeeeeeeeeieieiek', bij opwinding een scherp 'kotsiekotsiek'.
Leefomgeving	Open landschap, heidevelden, verlandingszones van meren, lichte, droge bossen, waterrijk laagland.	Zeer veelzijdig: open of licht bebost land, lichte bossen, toendra, half woestijnen zee-kusten, bergmassief, steile kusten steengroeven, diepe rivierdalen.
Voedsel	Uitsluitend vliegende vogels (zwaluwen, leeuweriken, gierzwaluwen, mussen, vinken, spreeuwen, merels) en vliegende insecten (libellen en kevers), in Afrikaans winterkwartier uitzwermende termieten.	Overwegend vogels, die zij vliegend achtervolgen. Stadsduiven vormen veelal het hoofdvoedsel in bepaalde gebieden en daarnaast spreeuwen, lijsters, leeuweriken kraaiachtigen. Meeuwen en strandvogels.
Voortplanting	<b>Boomvalken</b> bouwen zelf geen nest, maar betrekken oude nesten van roofvogels, kraaien of duiven in hoog naaldhout. Broedtijd juni. Grootte van het nest: 2-4 eieren, broedduur 28 dagen, nestperiode jongen 28 - 32 dagen. Als in juni de meeste kleine vogels vliegvlugge jongen hebben en het aanbod van	De Midden-Europese broedvogels nestelen meestal in beschutte nissen in steile rotswanden. In Noord-Duitsland en in Polen benutten de slechtvalken ook roofvogelhorsten in oude naald- en loofbossen; soms broeden zij op hoge gebouwen. Broedtijd maart/april. Grootte van het nest: 3-4 eieren, broedduur

	<p>vliegende insecten het grootst is, beginnen de <b>Boomvalken</b> met broeden. Het vrouwtje broedt, het mannetje brengt het voedsel en houdt de wacht. Sommige paren blijven jaren bij elkaar.</p>	<p>28-29 dagen nestperiode jongen 35-42 dagen. Beide partners broeden. Ze blijven hun gehele leven bij elkaar en gebruiken vaak dezelfde nestplaatsen. Af en toe waagt de slechtvalk een broedpoging op de Veluwe.</p>
Overige	<p>Van alle roofvogels is de <b>Boomvalk</b> door zijn gestroomlijnde lichaamsbouw het best aangepast om te jagen in het vrije luchtruim. Hij jaagt, zeer snel vliegend (gedurende korte tijd ca 240 km/h) op vliegende vogels en insecten. Soms jagen meerdere vogels samen op zwermende insecten of troepen vogels. Eind oktober vertrekken de <b>Boomvalken</b> naar hun winterkwartier in Oost- en Zuid-Afrika, om van midden april tot begin mei terug te keren in de broedgebieden.</p>	<p>De jacht van de <b>slechtvalken</b> begint of van een verhoogde uitkijkpost of vanuit een verkenningvlucht. Is de valk boven zijn slachtoffer, dan legt hij zij vleugels aan en stort zich met enorme snelheid, soms tot 300 km per uur, op zijn prooi. Vaak worden de vogels reeds door de botsing gedood. De vliegvlugge jongen uit het Midden-Europese broedgebied trekken om te overwinteren in zuidelijke richting tot het Iberisch Schiereiland.</p>